

## A Milieu d'un segment et distance entre deux points

### A.1 Découverte

#### 1 Milieu d'un segment

- Dans un repère  $(O; I, J)$ , placer les points  $A(2; 3)$ ,  $B(6; 1)$  et  $C(1; -3)$ .
- Lire les coordonnées des points  $M$ ,  $N$  et  $P$ , milieux respectifs des segments  $[AB]$ ,  $[AC]$  et  $[BC]$ .
  - Quelle relation existe-t-il entre les coordonnées de  $M$  et celles de  $A$  et  $B$ ? Vérifier qu'il existe une relation similaire pour les points  $N$  et  $P$ .
- Déterminer les coordonnées du point  $Z$ , milieu du segment  $[UV]$ , avec  $U(54; -9)$  et  $V(298; 79)$ .

- On lit  $M(4; 2)$ ,  $N(\frac{3}{2}; 0)$  et  $P(\frac{7}{2}; -1)$ .
  - On remarque que  $x_M = \frac{x_A + x_B}{2}$  et  $y_M = \frac{y_A + y_B}{2}$ .  
De même :  $x_N = \frac{x_A + x_C}{2}$  et  $y_N = \frac{y_A + y_C}{2}$ .  
Et enfin :  $x_P = \frac{x_B + x_C}{2}$  et  $y_P = \frac{y_B + y_C}{2}$ .
- En appliquant la même formule on a :

$$\begin{aligned} x_Z &= \frac{x_U + x_V}{2} & y_Z &= \frac{y_U + y_V}{2} \\ &= \frac{54 + 298}{2} & &= \frac{-9 + 79}{2} \\ &= \frac{352}{2} & &= \frac{70}{2} \\ &= 176 & &= 35 \end{aligned}$$

Donc  $Z(176; 35)$ .

#### 2 Distance entre deux points

- Dans un repère **orthonormé**  $(O; I, J)$ , placer les points  $A(1; 1)$ ,  $B(5; 4)$  et  $C(5; 1)$ .
- Quelle est la distance  $AC$ ? Exprimer celle-ci en fonction de  $x_A$  et  $x_B$ , **abscisses** des points  $A$  et  $B$ .
- Quelle est la distance  $BC$ ? Exprimer celle-ci en fonction de  $y_A$  et  $y_B$ , **ordonnées** des points  $A$  et  $B$ .
- Quelle est la nature de  $ABC$ ? Cela aurait-il été le cas dans un repère quelconque?
  - En déduire la distance  $AB$ , ainsi que son expression en fonction de  $x_A$ ,  $x_B$ ,  $y_A$  et  $y_B$ .

- $AC = 4$ . On remarque que  $4 = x_C - x_A = x_B - x_A$ .
  - $BC = 3$ . On remarque que  $BC = y_B - y_C = y_B - y_A$ .
  - $ABC$  est un triangle rectangle. Cela est le cas uniquement car les axes sont perpendiculaires, donc ce n'aurait pas été le cas dans un repère quelconque.
    - Dans le triangle  $ABC$ , on utilise le théorème de Pythagore.

$$\begin{aligned} AB^2 &= AC^2 + BC^2 \\ &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 \end{aligned}$$

- On en déduit que  $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$ .

### A.2 Faire ses gammes

- Dans chacun des cas, placer les points dans un repère orthonormé, puis calculer les coordonnées du milieu  $I$  du segment formé par les deux points indiqués. On pourra vérifier la cohérence entre les résultats obtenus et le graphique.

- $A(-4; 3)$  et  $F(6; 6)$ .

$$I\left(\frac{x_A + x_F}{2}; \frac{y_A + y_F}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I\left(1; \frac{9}{2}\right)$$

- $H(5; 1)$  et  $F(-2; 5)$ .

$$I\left(\frac{x_H + x_F}{2}; \frac{y_H + y_F}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I\left(\frac{3}{2}; 3\right)$$

- $E(2; -3)$  et  $B(6; 1)$ .

$$I\left(\frac{x_E + x_B}{2}; \frac{y_E + y_B}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I(4; -1)$$

- $E(1; 2)$  et  $F(-3; -1)$ .

$$I\left(\frac{x_E + x_F}{2}; \frac{y_E + y_F}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I\left(-1; \frac{1}{2}\right)$$

- $A(-3; 4)$  et  $M(-3; 6)$ .

$$I\left(\frac{x_A + x_M}{2}; \frac{y_A + y_M}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I(-3; 5)$$

- Dans chacun des cas, placer les points dans un repère orthonormé, puis calculer les coordonnées du milieu  $I$  du segment formé par les deux points indiqués. On pourra vérifier la cohérence entre les résultats obtenus et le graphique.

- 1.
- $E(1; -2)$
- et
- $D(-6; 0)$
- .

$$I\left(\frac{x_E + x_D}{2}; \frac{y_E + y_D}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I\left(-\frac{5}{2}; -1\right)$$

- 2.
- $E(2; 4)$
- et
- $M(-5; -4)$
- .

$$I\left(\frac{x_E + x_M}{2}; \frac{y_E + y_M}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I\left(-\frac{3}{2}; 0\right)$$

- 3.
- $H(4; 5)$
- et
- $M(-2; -5)$
- .

$$I\left(\frac{x_H + x_M}{2}; \frac{y_H + y_M}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I(1; 0)$$

- 4.
- $H(5; -1)$
- et
- $D(5; 5)$
- .

$$I\left(\frac{x_H + x_D}{2}; \frac{y_H + y_D}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I(5; 2)$$

- 5.
- $E(2; 0)$
- et
- $D(2; 4)$
- .

$$I\left(\frac{x_E + x_D}{2}; \frac{y_E + y_D}{2}\right), \text{ ce qui donne finalement } I(2; 2)$$

- 5 Soient  $A(1; 4)$ ,  $B(-3; 2)$  et  $C(-6; -7)$  dans un repère orthonormé  $(O; I, J)$ .  
Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$ , puis déterminer la distance entre chaque point.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-3 - 1)^2 + (2 - 4)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-2)^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(-6 - (-3))^2 + (-7 - 2)^2} = \sqrt{(-3)^2 + (-9)^2} = \sqrt{90} = 3\sqrt{10}.$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(-6 - 1)^2 + (-7 - 4)^2} = \sqrt{(-7)^2 + (-11)^2} = \sqrt{170}.$$

### A.3 Exercices d'entraînement

- 6 Dans chacun des cas, déterminer si le quadrilatère  $ABCD$  est un parallélogramme.

- 1.
- $A(-3; 2)$
- ,
- $B(-4; -2)$
- ,
- $C(1; -5)$
- et
- $D(2; -1)$
- .

$ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu.

Soient  $I$  le milieu de  $[AC]$  et  $J$  le milieu de  $[BD]$ .

$$\begin{aligned} x_I &= \frac{x_A + x_C}{2} \\ &= \frac{-3 + 1}{2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_I &= \frac{y_A + y_C}{2} \\ &= \frac{2 - 5}{2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc  $I(-1; -\frac{3}{2})$ .

$$\begin{aligned} x_J &= \frac{x_B + x_D}{2} \\ &= \frac{-4 + 2}{2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_J &= \frac{y_B + y_D}{2} \\ &= \frac{-2 - 1}{2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc  $J(-1; -\frac{3}{2})$ .

Les points  $I$  et  $J$  ont les mêmes coordonnées, donc les diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  se coupent en leur milieu.

On en déduit que  $ABCD$  est un parallélogramme.

- 2.
- $A(-4; 2)$
- ,
- $B(-3; -4)$
- ,
- $C(3; -5)$
- et
- $D(2; -1)$
- .

$ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu.

Soient  $I$  le milieu de  $[AC]$  et  $J$  le milieu de  $[BD]$ .

$$\begin{aligned} x_I &= \frac{x_A + x_C}{2} \\ &= \frac{-4 + 3}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_I &= \frac{y_A + y_C}{2} \\ &= \frac{2 - 5}{2} \\ &= -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

Donc  $I(-\frac{1}{2}; -\frac{3}{2})$ .

$$\begin{aligned} x_J &= \frac{x_B + x_D}{2} \\ &= \frac{-3 + 2}{2} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} y_J &= \frac{y_B + y_D}{2} \\ &= \frac{-4 - 1}{2} \\ &= -\frac{5}{2} \end{aligned}$$

Donc  $J(-\frac{1}{2}; -\frac{5}{2})$ .

Les points  $I$  et  $J$  n'ont pas les mêmes coordonnées, donc les diagonales  $[AC]$  et

$[BD]$  ne se coupent pas en leur milieu.

On en déduit que  $ABCD$  n'est pas un parallélogramme.

3.  $A(5;4)$ ,  $B(-5;0)$ ,  $C(-14;-12)$  et  $D(-4;-10)$ .

$ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu.

Soient  $I$  le milieu de  $[AC]$  et  $J$  le milieu de  $[BD]$ .

$$\begin{aligned}x_I &= \frac{x_A + x_C}{2} \\ &= \frac{5 - 14}{2} \\ &= -\frac{9}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_I &= \frac{y_A + y_C}{2} \\ &= \frac{4 - 12}{2} \\ &= -4\end{aligned}$$

Donc  $I\left(-\frac{9}{2}; -4\right)$ .

$$\begin{aligned}x_J &= \frac{x_B + x_D}{2} \\ &= \frac{-5 - 4}{2} \\ &= -\frac{9}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_J &= \frac{y_B + y_D}{2} \\ &= \frac{0 - 10}{2} \\ &= -5\end{aligned}$$

Donc  $J\left(-\frac{9}{2}; -5\right)$ .

Les points  $I$  et  $J$  n'ont pas les mêmes coordonnées, donc les diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  ne se coupent pas en leur milieu.

On en déduit que  $ABCD$  n'est pas un parallélogramme.

4.  $A(-8;-14)$ ,  $B(2;-4)$ ,  $C(14;0)$  et  $D(4;-10)$ .

$ABCD$  est un parallélogramme si et seulement si ses diagonales se coupent en leur milieu.

Soient  $I$  le milieu de  $[AC]$  et  $J$  le milieu de  $[BD]$ .

$$\begin{aligned}x_I &= \frac{x_A + x_C}{2} \\ &= \frac{-8 + 14}{2} \\ &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_I &= \frac{y_A + y_C}{2} \\ &= \frac{-14 + 0}{2} \\ &= -7\end{aligned}$$

Donc  $I(3;-7)$ .

$$\begin{aligned}x_J &= \frac{x_B + x_D}{2} \\ &= \frac{2 + 4}{2} \\ &= 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}y_J &= \frac{y_B + y_D}{2} \\ &= \frac{-4 - 10}{2} \\ &= -7\end{aligned}$$

Donc  $J(3;-7)$ .

Les points  $I$  et  $J$  ont les mêmes coordonnées, donc les diagonales  $[AC]$  et  $[BD]$  se coupent en leur milieu.

On en déduit que  $ABCD$  est un parallélogramme.

- 7 Soient  $A(10;-4)$ ,  $B(10;6)$  et  $C(6;-2)$ . Démontrer que  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(10 - 10)^2 + (6 - (-4))^2} = \sqrt{0^2 + 10^2} = \sqrt{100} = 10.$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(6 - 10)^2 + (-2 - 6)^2} = \sqrt{(-4)^2 + (-8)^2} = \sqrt{80} = 4\sqrt{5}.$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(6 - 10)^2 + (-2 - (-4))^2} = \sqrt{(-4)^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

On remarque que le plus grand côté est  $[AB]$ .

$$\text{Or : } AC^2 + BC^2 = (4\sqrt{5})^2 + (2\sqrt{5})^2 = 80 + 20 = 100 = AB^2.$$

Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore,  $ABC$  est rectangle en  $C$ .

- 8 Soient  $A(-4;-1)$ ,  $B(-5;1)$  et  $C(0;1)$ . Démontrer que  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(-5 - (-4))^2 + (1 - (-1))^2} = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}.$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(0 - (-5))^2 + (1 - 1)^2} = \sqrt{5^2 + 0^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(0 - (-4))^2 + (1 - (-1))^2} = \sqrt{4^2 + 2^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

On remarque que le plus grand côté est  $[BC]$ .

$$\text{Or : } AC^2 + AB^2 = (2\sqrt{5})^2 + (\sqrt{5})^2 = 20 + 5 = 25 = BC^2.$$

Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore,  $ABC$  est rectangle en  $A$ .

## B Applications

### B.1 Exercices d'entraînement

- 9 Soient  $A(-3;2)$ ,  $B(4;-2)$  et  $C(11;-6)$ .

- Placer les points dans un repère orthonormé.
- Déterminer si les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(4 - (-3))^2 + (-2 - 2)^2} = \sqrt{7^2 + (-4)^2} = \sqrt{65}.$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(11 - 4)^2 + (-6 - (-2))^2} = \sqrt{7^2 + (-4)^2} = \sqrt{65}.$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(11 - (-3))^2 + (-6 - 2)^2} = \sqrt{14^2 + (-8)^2} = \sqrt{260} = 2\sqrt{65}.$$

On remarque que le plus grand segment est  $[AC]$ .

$$\text{Or : } BC + AB = (\sqrt{65}) + (\sqrt{65}) = \sqrt{65} + \sqrt{65} = 2\sqrt{65} = AC.$$

Donc les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

10 Soient  $A(15; 25)$ ,  $B(20; 18)$  et  $C(17; 22)$ .

Déterminer si les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  sont alignés.

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2} = \sqrt{(20 - 15)^2 + (18 - 25)^2} = \sqrt{5^2 + (-7)^2} = \sqrt{74}.$$

$$BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(17 - 20)^2 + (22 - 18)^2} = \sqrt{(-3)^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

$$AC = \sqrt{(x_C - x_A)^2 + (y_C - y_A)^2} = \sqrt{(17 - 15)^2 + (22 - 25)^2} = \sqrt{2^2 + (-3)^2} = \sqrt{13}.$$

On remarque que le plus grand segment est  $[AB]$ .


$$\text{Or : } AC + BC = 5 + \sqrt{13} \neq \sqrt{74} = AB.$$

$$AB \neq AC + BC, \text{ donc les points } A, B \text{ et } C \text{ ne sont pas alignés.}$$

11 Soient  $M(7; 6)$ ,  $N(6; 1)$  et  $P(1; 6)$  trois points.

On cherche à calculer l'aire du disque qui passe par ces 3 points.

- Placer ces trois points dans un repère orthonormé.
- Par construction, placer le centre du cercle passant par  $M$ ,  $N$  et  $P$ .
- Comment s'appelle ce cercle?
- Vérifier par le calcul que le centre du cercle a pour coordonnées  $(4; 4)$ .
- En déduire l'aire du disque passant par  $M$ ,  $N$  et  $P$ .



On trace les médiatrices d'au moins deux des côtés du triangle. Le centre du **cercle circonscrit** du triangle  $MNP$  (i.e le cercle passant par les trois sommets du triangle) se trouve à l'intersection des médiatrices.

Pour vérifier les coordonnées du centre par le calcul, on montre que les trois sommets en sont à égale distance.

Nommons  $C$  le centre du cercle.


On montre que  $MC = NC = PC = \sqrt{13}$ .

Soit  $A$  l'aire du disque passant par  $M$ ,  $N$  et  $P$ .

$$A = \pi \times r^2 = \pi \times MC^2 = 13\pi.$$

12 Soient  $A(-1; 2)$ ,  $B(-1; -4)$  et  $C(2; 2)$ .


- Placer les points  $A$ ,  $B$  et  $C$  dans un repère orthonormé.
- On cherche à calculer la distance entre le point  $A$  et la droite  $(BC)$ .
  - Placer le point  $H$ , projeté orthogonal de  $A$  sur  $(BC)$ . Laisser les traits de construction apparents.
  - On suppose que le point  $H$  a pour coordonnées  $H(\frac{7}{5}; 0,8)$ . En déduire la distance entre  $A$  et  $(BC)$ .



$$AH = \sqrt{(x_H - x_A)^2 + (y_H - y_A)^2} = \sqrt{\left(\frac{7}{5} - (-1)\right)^2 + \left(\frac{4}{5} - 2\right)^2} = \sqrt{\frac{12^2}{5} + \left(-\frac{6}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{36}{5}} = \frac{6\sqrt{5}}{5}$$

**13** On cherche à calculer l'aire du triangle  $ABC$  ci-dessous.  
On suppose que l'on est dans un repère orthonormé dans lequel on a  $A(3; 2)$ ,  $B(-3; -3,5)$  et  $C(1,5; -1,25)$ .

1. Tracer le triangle  $ABC$  dans un repère orthonormé.
2. Placer le point  $H$ , projeté orthogonal de  $A$  sur  $(BC)$ .
3. On suppose que le point  $H$  a pour coordonnées  $H(4; 0)$ . Calculer l'aire du triangle  $ABC$ .



Soit  $\mathcal{A}$  l'aire du triangle  $ABC$ .

$$\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2} = \frac{BC \times AH}{2}$$

$$\text{Or : } BC = \sqrt{(x_C - x_B)^2 + (y_C - y_B)^2} = \sqrt{(1,5 - (-3))^2 + (-1,25 - (-3,5))^2} = \sqrt{4,5^2 + 2,25^2} = \sqrt{25,3125}$$

$$AH = \sqrt{(x_H - x_A)^2 + (y_H - y_A)^2} = \sqrt{(4 - 3)^2 + (0 - 2)^2} = \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{5}$$


$$\text{Ainsi : } \mathcal{A} = \frac{\sqrt{25,3125} \times \sqrt{5}}{2} = 5,625$$

**14** Soient  $A(-1; 3)$ ,  $B(3; 6)$  et  $C(3; 3)$ .

1. Démontrer que  $ABC$  est rectangle et préciser en quel sommet.
2. En déduire l'hypothénuse de  $ABC$ .
3. Calculer la valeur de  $\widehat{BAC}$  de trois manières différentes, en utilisant son cosinus, puis son sinus, et enfin sa tangente.
4. En déduire la mesure de l'angle  $\widehat{ABC}$ .

$$\widehat{BAC} \approx 36,87^\circ. \text{ On en déduit } \widehat{ABC} \approx 53,13^\circ.$$

**15** Sur un terrain, une footballeuse se trouve à  $16,50 \text{ m}$  de la ligne de but et à  $25 \text{ m}$  du poteau de but le plus proche.



La largeur d'un but est égale à 7,32 m.  
Déterminer l'angle de tir de la footballeuse. On arrondira la mesure au degré près.

On note  $J$ ,  $L$ ,  $P_1$  et  $P_2$  les positions respectives du joueur, du projeté orthogonal du joueur sur la ligne, du premier et du seconde poteaux.

$JLP_1$  est rectangle, on en déduit que  $\cos(\widehat{LJP_1}) = \frac{16,5}{25}$ .

$$\cos(\widehat{LJP_1}) = \frac{16,5}{25} \Leftrightarrow \widehat{LJP_1} = \cos^{-1}\left(\frac{16,5}{25}\right)$$

Or  $\cos^{-1}\left(\frac{16,5}{25}\right) \approx 48,7$ , donc  $\widehat{LJP_1} \approx 48,7^\circ$ .

De plus, d'après le théorème de Pythagore :  $JP_1^2 = JL^2 + LP_1^2$ .

$$\begin{aligned} JP_1^2 = JL^2 + LP_1^2 &\Leftrightarrow 25^2 = 16,5^2 + LP_1^2 \\ &\Leftrightarrow 25^2 - 16,5^2 = LP_1^2 \\ &\Leftrightarrow 352,75 = LP_1^2 \\ &\Leftrightarrow LP_1 = \sqrt{352,75} \text{ car } LP_1 > 0 \end{aligned}$$

Ainsi :  $LP_1 = \sqrt{352,75} \approx 18,78$ .

On en déduit :  $LP_2 = LP_1 + 7,32 \approx 26,1$ .

Dans la triangle rectangle  $LP_2J$  :  $\tan \widehat{LP_2J} \approx \frac{26,1}{16,5}$ .

D'où :  $\widehat{LP_2J} \approx \tan^{-1}\left(\frac{26,1}{16,5}\right) \approx 57,7^\circ$ .

On peut alors calculer  $\widehat{P_1JP_2} = \widehat{LP_2J} - \widehat{LJP_1} \approx 57,7 - 48,7 = 9^\circ$ .

Donc l'angle de tir de la footballeuse est d'environ  $9^\circ$ .

**16** On munit le plan d'un repère orthonormé  $(O; I, J)$  d'unité 2 cm.

Soient  $A(2; 1)$ ,  $B(5; 1)$ ,  $C(5; -2)$  et  $D(2; -2)$ .

- Faire une figure.
- (a) Déterminer les coordonnées de  $K$ , milieu de  $[AC]$ .
- (b) Déterminer les coordonnées de  $L$ , milieu de  $[BC]$ .

(c) En déduire que  $ABCD$  est un parallélogramme.

3. (a) Calculer  $AC$ ,  $AD$  et  $DC$ .

(b) En déduire la nature du triangle  $ADC$ .

4. Conclure sur la nature du parallélogramme  $ABCD$ .

## B.2 Exercices d'approfondissement

**17** Soient  $A(-2; 1)$  et  $B(4; 3)$ .

1. Calculer les coordonnées de  $K$ , milieu de  $[AB]$ .

2. Soit  $M(x_M; y_M)$  un point du cercle de diamètre  $[AB]$ .

(a) Faire une figure représentant la situation.

(b) Conjecturer la nature du triangle  $ABM$ .

3. (a) Démontrer que  $AB = 2KM$ .

(b) En déduire  $AB^2$  en fonction de  $x_M$  et  $y_M$ .

(c) Exprimer  $AM^2 + BM^2$  en fonction de  $x_M$  et  $y_M$ .

(d) Conclure

1.  $x_K = \frac{-2+4}{2} = 1$  et  $y_K = \frac{1+3}{2} = 2$ , donc  $K(1; 2)$ .

2. (a)

(b) Conjecture :  $ABM$  est rectangle en  $M$ .

3.  $AB$  est un diamètre du cercle, et  $[KM]$  est un rayon du cercle.  
Donc  $AB = 2KM$ .

(a)  $AB = 2KM \Leftrightarrow AB^2 = 4KM^2$

$$\begin{aligned} AB^2 &= 4((x_M - x_K)^2 + (y_M - y_K)^2) \\ &= 4((x_M - 1)^2 + (y_M - 2)^2) \\ &= 4(x_M^2 - 2x_M + 1^2 + y_M^2 - 4y_M + 2^2) \\ &= 4x_M^2 - 8x_M + 4 + 4y_M^2 - 16y_M + 16 \\ &= 4x_M^2 - 8x_M + 4y_M^2 - 16y_M + 20 \end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned} AM^2 + BM^2 &= (x_M - x_A)^2 + (y_M - y_A)^2 + (x_M - x_B)^2 + (y_M - y_B)^2 \\ &= (x_M + 2)^2 + (y_M - 1)^2 + (x_M - 4)^2 + (y_M - 3)^2 \\ &= x_M^2 + 4x_M + (-2)^2 + y_M^2 - 2y_M + 1^2 \\ &\quad + x_M^2 - 8x_M + 4^2 + y_M^2 - 6y_M + 3^2 \\ &= 2x_M^2 - 4x_M + 2y_M^2 - 8y_M + 30 \end{aligned}$$

$$(c) AB^2 = 4x_M^2 - 8x_M + 4y_M^2 - 16y_M + 20.$$

Or, en calculant à l'aide des coordonnées de  $A$  et  $B$ , on trouve aussi  $AB^2 = 40$ .

Ainsi :

$$\begin{aligned} AB^2 &= 4x_M^2 - 8x_M + 4y_M^2 - 16y_M + 20 \\ \Leftrightarrow 40 &= 2(2x_M^2 - 4x_M + 2y_M^2 - 8y_M + 10) \\ \Leftrightarrow 2x_M^2 - 4x_M + 2y_M^2 - 8y_M + 10 &= 20 \\ \Leftrightarrow 2x_M^2 - 4x_M + 2y_M^2 - 8y_M &= 10 \end{aligned}$$

En revenant à  $AM^2 + BM^2$ , on obtient alors :

$$\begin{aligned} AM^2 + BM^2 &= 2x_M^2 - 4x_M + 2y_M^2 - 8y_M + 30 \\ &= 10 + 30 \\ &= 40 \\ &= AB^2 \end{aligned}$$

Donc d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ .

On vient ainsi de démontrer la propriété :

"Si un triangle a pour côté un diamètre de son cercle circonscrit, alors il est rectangle".

18 Soit  $JKL$  un triangle et  $H$  le projeté orthogonal de  $K$  sur  $(JL)$ .

1. Faire un schéma représentant la situation.
2. En utilisant les notations de l'énoncé, quelle formule permet de calculer l'aire de  $JKL$ ?
3. Démontrer que  $KH = JK \times \sin(\widehat{LJK})$ .
4. En déduire une nouvelle expression de l'aire de  $JKL$  qui ne fait pas intervenir la hauteur.
5. Calculer l'aire de  $ABC$  tel que  $AB = 6$ ,  $AC = 5$  et  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ .