

Kholle A: 2)

- $f(P, Q)$  est réel.
- $f(P, Q) = P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1) = Q(-1)P(-1) + Q(0)P(0) + Q(1)P(1) = f(Q, P)$ .
- $f(\lambda P + R, Q) = (\lambda P + R)(-1)Q(-1) + (\lambda P + R)(0)Q(0) + (\lambda P + R)(1)Q(1) = (\lambda P(-1) + R(-1))Q(-1) + (\lambda P(0) + R(0))Q(0) + (\lambda P(1) + R(1))Q(1)$

On en déduit :  $f(\lambda P + R, Q) = \lambda(P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0) + P(1)Q(1)) + (R(-1)Q(-1) + R(0)Q(0) + R(1)Q(1))$ .

Finalement, on a :  $f(\lambda P + R, Q) = \lambda f(P, Q) + f(R, Q)$ .

- $f(P, P) = (P(-1))^2 + (P(0))^2 + (P(1))^2 \geq 0$  en tant que somme de carrés.
  - Si  $f(P, P) = 0$  alors  $(P(-1))^2 + (P(0))^2 + (P(1))^2 = 0$ . Une somme de réels positifs est nulle si, et seulement si, tous les termes de la somme sont nuls. On obtient :  $P(-1) = P(0) = P(1) = 0$ . Le polynôme  $P$  de  $\mathbb{R}_2[X]$ , qui possède au moins trois racines distinctes, est donc nécessairement le polynôme nul. Ainsi, on a montré que :  $f(P, P) = 0 \Rightarrow P = 0$ .
- En conclusion, l'application  $f$  définit ainsi un produit scalaire sur  $\mathbb{R}_2[X]$ .

**2. a)** Expliquons, par exemple, le calcul de  $a_{1,2} = \langle X, X^2 \rangle$ . On pose  $P = X$  et  $Q = X^2$ .

On a :  $P(-1) = -1, Q(-1) = 1, P(0) = 0, Q(0) = 0, P(1) = 1, Q(1) = 1$ .

Ainsi :  $a_{1,2} = \langle X, X^2 \rangle = -1 \times 1 + 0 \times 0 + 1 \times 1 = 0$ . En procédant ainsi, on trouve :

$$a_{0,0} = \langle 1, 1 \rangle = 3, \quad a_{1,1} = \langle X, X \rangle = 2, \quad a_{2,2} = \langle X^2, X^2 \rangle = 2.$$

$$a_{0,1} = a_{1,0} = \langle 1, X \rangle = 0, \quad a_{0,2} = a_{2,0} = \langle 1, X^2 \rangle = 2, \quad a_{1,2} = a_{2,1} = \langle X, X^2 \rangle = 0.$$

**b)** Compte tenu des résultats précédents, on a :

$$\bullet \langle 1, X \rangle = a_{0,1} = 0$$

$$\bullet \langle 1, X^2 - \frac{2}{3} \rangle = \langle 1, X^2 \rangle - \frac{2}{3} \langle 1, 1 \rangle = a_{0,2} - \frac{2}{3} a_{0,0} = 2 - \frac{2}{3} \times 3 = 0.$$

$$\bullet \langle X, X^2 - \frac{2}{3} \rangle = \langle X, X^2 \rangle - \frac{2}{3} \langle X, 1 \rangle = a_{1,2} - \frac{2}{3} a_{1,0} = 0.$$

Ainsi, la famille  $\left(1, X, X^2 - \frac{2}{3}\right)$  est orthogonale.

**3.** Les sous-espaces  $F$  et  $G$  sont orthogonaux si :  $\langle 1 + X, X - X^2 \rangle = 0$  et  $\langle 1 - X^2, X - X^2 \rangle = 0$ .

$$\bullet \langle 1 + X, X - X^2 \rangle = a_{0,1} - a_{0,2} + a_{1,1} - a_{1,2} = 0 - 2 + 2 - 0 = 0.$$

$$\bullet \langle 1 - X^2, X - X^2 \rangle = a_{0,1} - a_{0,2} - a_{2,1} + a_{2,2} = 0 - 2 - 0 + 2 = 0.$$

Ainsi, les sous-espaces vectoriels  $F$  et  $G$  sont donc orthogonaux.

## Kholle A 4)

1. Le réel  $\lambda$  est valeur propre de  $A$  si, et seulement si,  $A - \lambda I$  n'est pas inversible.

On a :  $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 3-\lambda & 2 & 4 \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 4 & 2 & 3-\lambda \end{pmatrix}$ . Cherchons une réduite de Gauss de  $A - \lambda I$ .

On échange les lignes 1 et 3 pour obtenir :  $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3-\lambda \\ 2 & -\lambda & 2 \\ 3-\lambda & 2 & 4 \end{pmatrix}$ .

Les opérations  $L_2 \leftarrow 2L_2 - L_1$  et  $L_3 \leftarrow 4L_3 - (3-\lambda)L_1$  donnent :  $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3-\lambda \\ 0 & -2-2\lambda & 1+\lambda \\ 0 & 2+2\lambda & (1+\lambda)(7-\lambda) \end{pmatrix}$ .

Enfin, avec  $L_3 \leftarrow L_3 + L_2$ , on obtient :  $\begin{pmatrix} 4 & 2 & 3-\lambda \\ 0 & -2-2\lambda & 1+\lambda \\ 0 & 0 & (1+\lambda)(8-\lambda) \end{pmatrix}$ .

Ainsi, on trouve :  $\lambda \in \text{Sp}(A) \Leftrightarrow -2-2\lambda = 0$  ou  $(1+\lambda)(8-\lambda) = 0 \Leftrightarrow \lambda = -1$  ou  $\lambda = 8$ .

On en déduit :  $\text{Sp}(A) = \{-1, 8\}$ .

Pour la recherche des sous-espaces propres, on note  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  et on utilise la réduite de Gauss

de  $A$  obtenue ci-dessus.

• Pour la valeur propre  $\lambda = -1$  :  $(A + I)X = 0 \Leftrightarrow 4x + 2y + 4z = 0 \Leftrightarrow y = -2x - 2z$ .

$$(A + I)X = 0 \Leftrightarrow X = \begin{pmatrix} x \\ -2x - 2z \\ z \end{pmatrix} = x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Le sous-espace propre de  $A$  associé à la valeur propre  $-1$  est :  $E_{-1} = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$ .

• Pour la valeur propre  $\lambda = 8$  :  $(A - 8I)X = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x + 2y - 5z = 0 \\ -18y + 9z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2y \\ z = 2y \end{cases}$ .

Le sous-espace propre de  $A$  associé à la valeur propre 8 est :

$$E_8 = \left\{ \begin{pmatrix} 2y \\ y \\ 2y \end{pmatrix}, y \in \mathbb{R} \right\} = \text{Vect} \left( \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right). \text{ On note : } e_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

2. Déterminons une famille orthonormale de chaque sous-espace propre.

• Pour  $E_{-1}$ , on note  $e_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$  et on détermine un vecteur  $e_2 = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  non nul de  $E_{-1}$  tel que :

$$\langle e_2, e_1 \rangle = 0.$$

On a :  $\begin{cases} e_2 \in E_{-1} \\ \langle e_2, e_1 \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 4a + 2b + 4c = 0 \\ a - 2b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -\frac{5}{2}b \\ a = 2b \end{cases}$ . Le vecteur  $e_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$  convient.

La famille  $(e_1, e_2)$  ainsi construite est une base orthogonale de  $E_{-1}$ . Comme  $\|e_1\| = \sqrt{5}$  et  $\|e_2\| = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$ , la famille  $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}e_1, \frac{1}{3\sqrt{5}}e_2\right)$  est une base orthonormale de  $E_{-1}$ .

• Pour  $E_8$ , comme  $\|e_3\| = 3$ , la famille  $\left(\frac{1}{3}e_3\right)$  est une base orthonormale de  $E_8$ .

• Ainsi, la famille  $\left(\frac{1}{\sqrt{5}}e_1, \frac{1}{3\sqrt{5}}e_2, \frac{1}{3}e_3\right)$  est une base orthonormale de  $\mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R})$ , formée de vecteurs propres de  $A$ , dont les valeurs propres associées sont respectivement :  $-1$ ,  $-1$  et  $8$ .

Finalement, on obtient  $P = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{5} & 4/3\sqrt{5} & 2/3 \\ -2/\sqrt{5} & 2/3\sqrt{5} & 1/3 \\ 0 & -5/3\sqrt{5} & 2/3 \end{pmatrix}$  et  $D = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 8 \end{pmatrix}$ .

La matrice  $P$ , ainsi construite, est orthogonale et on a la relation :  $A = PD'P$ .

Kholles A 1)

1. Soit  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3)$  et  $z = (z_1, z_2, z_3)$  trois vecteurs de  $\mathbb{R}^3$ , et  $\lambda$  un réel.

• On constate d'abord que  $f(x, y)$  est réel.

$$\begin{aligned} f(x, y) &= (x_1 - 2x_2)(y_1 - 2y_2) + x_2y_2 + (x_2 + x_3)(y_2 + y_3) \\ &= (y_1 - 2y_2)(x_1 - 2x_2) + y_2x_2 + (y_2 + y_3)(x_2 + x_3) = f(y, x). \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(\lambda x + y, z) &= (\lambda x_1 + y_1 - 2(\lambda x_2 + y_2))(z_1 - 2z_2) + (\lambda x_2 + y_2)z_2 + (\lambda x_2 + y_2 + \lambda x_3 + y_3)(z_2 + z_3) \\ &= \lambda[(x_1 - 2x_2)(z_1 - 2z_2) + x_2z_2 + (x_2 + x_3)(z_2 + z_3)] \\ &\quad + [(y_1 - 2y_2)(z_1 - 2z_2) + y_2z_2 + (y_2 + y_3)(z_2 + z_3)]. \end{aligned}$$

Finalement, on obtient :  $f(\lambda x + y, z) = \lambda f(x, z) + f(y, z)$ .

•  $f(x, x) = (x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 + (x_2 + x_3)^2 \geq 0$  en tant que somme de carrés.

• Si  $f(x, x) = 0$ , on obtient :  $(x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 + (x_2 + x_3)^2 = 0$ . Une somme de réels positifs est nulle si, et seulement si, tous les termes de la somme sont nuls. On en déduit :

$$x_1 - 2x_2 = x_2 = x_2 + x_3 = 0 \text{ soit } x_2 = x_3 = x_1 = 0. \text{ Ainsi, on a montré que : } f(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

En conclusion, l'application  $f$  définit ainsi un produit scalaire sur  $\mathbb{R}^3$ .

2. a) On a :  $\langle e_1, e_2 \rangle = (1-2)(-3-2(-2)) + 1(-2) + (1+2)(-2+3) = 0$ . Ainsi, la famille  $(e_1, e_2)$  est orthogonale.

b) Soit  $x = (x_1, x_2, x_3)$  un vecteur de  $\mathbb{R}^3$ . On a :  $\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = (x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 + (x_2 + x_3)^2$ .

•  $\|e_1\|^2 = \langle e_1, e_1 \rangle = (1-2)^2 + 1^2 + (1+1)^2 = 6$ , donc :  $\|e_1\| = \sqrt{6}$ . On pose :  $u_1 = \frac{1}{\sqrt{6}}e_1$ .

•  $\|e_2\|^2 = \langle e_2, e_2 \rangle = (-3+4)^2 + (-2)^2 + (-2+3)^2 = 6$ , donc :  $\|e_2\| = \sqrt{6}$ . On pose :  $u_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}e_2$ .

La famille  $(u_1, u_2)$ , ainsi construite, est bien une famille orthonormale de  $\mathbb{R}^3$ .

### Première partie.

1. Si  $f$  est un endomorphisme orthogonal de  $E$ , on sait que, pour tout couple  $(x, y)$  de vecteurs de  $E$ , on a :  $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ . En particulier :  $\langle f(x), f(x) \rangle = \langle x, x \rangle$ .

Si on considère un vecteur  $x$  appartenant à  $\text{Ker } f$ , on a :  $f(x) = 0$ . On en déduit :  $\langle x, x \rangle = 0$ .

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \frac{1}{2} (\|f(x+y)\|^2 - \|f(x)\|^2 - \|f(y)\|^2) \text{ car } f \text{ est linéaire.}$$

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \frac{1}{2} (\|x+y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \text{ d'après l'hypothèse.}$$

$$\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle. \text{ Ainsi, l'endomorphisme } f \text{ est orthogonal.}$$

On a montré que l'endomorphisme  $f$  est orthogonal si, et seulement si, pour tout vecteur  $x$  de  $E$ , on a :  $\|f(x)\| = \|x\|$ .

2. Soit  $f$  un endomorphisme orthogonal de  $E$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $E$ . On considère la famille  $\mathcal{B}' = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ . Comme  $f$  est orthogonal, pour tout couple  $(x, y)$  de vecteurs de  $E$ , on a :  $\langle f(x), f(y) \rangle = \langle x, y \rangle$ . En particulier, pour tout couple  $(i, j)$  de  $[1, n]$  :  $\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \langle e_i, e_j \rangle$ . Comme la base  $\mathcal{B}$  est orthonormale, on en déduit :

$$\langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}. \text{ Ainsi, la famille } \mathcal{B}' \text{ est une famille orthonormale de } E. \text{ Comme}$$

elle est formée de  $n$  vecteurs de  $E$ , qui est de dimension  $n$ , on peut conclure que  $\mathcal{B}'$  est une base orthonormale de  $E$ .

Réciproquement, on considère une base orthonormale  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  et  $f$ , un endomorphisme tel que la famille  $\mathcal{B}' = (f(e_1), \dots, f(e_n))$  soit une base orthonormale de  $E$ .

Soit  $x$  un vecteur de  $E$ . On note  $x_1, \dots, x_n$  les coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$ . On a :

$$x = \sum_{i=1}^n x_i e_i \text{ et } f(x) = \sum_{i=1}^n x_i f(e_i).$$

$$\|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i e_i, \sum_{j=1}^n x_j e_j \right\rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ car la base } \mathcal{B} \text{ est orthonormale.}$$

$$\text{De la même manière, on a : } \|f(x)\|^2 = \langle f(x), f(x) \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n x_i f(e_i), \sum_{j=1}^n x_j f(e_j) \right\rangle. \text{ Par bilinéarité,}$$

$$\text{on obtient : } \|f(x)\|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \langle f(e_i), f(e_j) \rangle = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n x_i x_j \langle e_i, e_j \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 \text{ (l'avant-dernière}$$

égalité provenant du fait que  $f$  est orthogonal).

Ainsi, pour tout vecteur  $x$  de  $E$ , on a :  $\|f(x)\| = \|x\|$ . Grâce à la première question de cette partie, on en déduit que  $f$  est orthogonal.

On a montré que  $f$  est orthogonal si, et seulement si,  $f$  transforme toute base orthonormale de  $E$  en une base orthonormale de  $E$ .

3. • Soit  $f$  un endomorphisme orthogonal de  $E$ . On note  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base orthonormale de  $E$  et  $M$  la matrice de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Par définition de la matrice d'un endomorphisme dans

une base, les colonnes de  $M$  sont les coordonnées de  $f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n)$  dans la base  $\mathcal{B}$  donc  $M$  est la matrice de passage de la base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  à la famille  $\mathcal{B}' = (f(e_1), \dots, f(e_n))$ . Comme  $f$  est orthogonal et comme  $\mathcal{B}$  est orthonormale, la famille  $\mathcal{B}'$  est, d'après la question précédente, une base orthonormale de  $E$ . Ainsi,  $M$  est la matrice de passage entre deux bases orthonormales. La matrice  $M$  est donc orthogonale.

• Réciproquement, on considère une base orthonormale  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  de  $E$  et  $f$ , un endomorphisme tel que la matrice  $M$  de  $f$  dans la base  $\mathcal{B}$  soit orthogonale. La matrice  $M$  vérifie donc l'égalité :  ${}^tMM = I$ .

Soit  $x$  un vecteur de  $E$ . On note  $(x_1, \dots, x_n)$  les coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$  et  $(y_1, \dots, y_n)$  les coordonnées du vecteur  $f(x)$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Soit  $X$  et  $Y$  les matrices de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  définies

par :  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ . On sait que :  $Y = MX$ . Comme la base  $\mathcal{B}$  est orthonormale, on a :

$\|f(x)\|^2 = {}^tYY = {}^t(MX)MX = {}^tX{}^tMMX = {}^tXX = \|x\|^2$ . Ainsi, pour tout vecteur  $x$  de  $E$ , on a :

$\|f(x)\| = \|x\|$ . Grâce à la première question de cette partie, on en déduit que  $f$  est orthogonal.

On a montré que  $f$  est orthogonal si, et seulement si, la matrice de  $f$  dans une base orthonormale de  $E$  est orthogonale.

Kholle 2 A)

**1. a)** Soit  $x$  et  $y$  deux vecteurs de  $E$ . On note  $(x_1, \dots, x_n)$  et  $(y_1, \dots, y_n)$  les coordonnées respectives de  $x$  et  $y$  dans la base  $\mathcal{B}$ . Soit  $X$  et  $Y$  les matrices de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$  définies par :

$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$  et  $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ . Les coordonnées des vecteurs  $u(x)$  et  $u^*(x)$ , dans la base  $\mathcal{B}$ , sont

données respectivement par les produits matriciels  $MX$  et  ${}^tMY$ .

Comme la base  $\mathcal{B}$  est orthonormale, on a :

$$\langle u(x), y \rangle = {}^t(MX)Y = {}^tX{}^tMY = {}^tX({}^tMY) = \langle x, u^*(y) \rangle.$$

**b)** Soit  $v$  un endomorphisme de  $E$  et  $y$  un vecteur quelconque de  $E$ . Pour tout vecteur  $x$  de  $E$ , on a :  $\langle u(x), y \rangle = \langle x, v(y) \rangle$ . Par définition de  $u^*$ , on en déduit :  $\langle x, v(y) \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ .

On a donc, pour tout vecteur  $x$  de  $E$  :  $\langle x, (v - u^*)(y) \rangle = 0$ . On en déduit que  $(v - u^*)(y)$  appartient à  $E^\perp$ , ce qui signifie que :  $(v - u^*)(y) = 0$ . Ceci étant vrai pour tout vecteur  $y$  de  $E$ , on a :  $v = u^*$ . On a bien montré que  $u^*$  est le seul endomorphisme de  $E$  qui vérifie :

$$\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$$

2. Si  $u = u^*$ , on a :  $\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$ .

Ainsi,  $u$  est un endomorphisme symétrique de  $E$ .

Réciproquement, si  $u$  est un endomorphisme symétrique, on a :

$\forall (x, y) \in E^2, \langle u(x), y \rangle = \langle x, u(y) \rangle$ .

D'après la question 1.b),  $u^*$  est le seul endomorphisme tel que  $\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ , on en déduit que :  $u^* = u$ .

3. Soit  $y$  un vecteur de  $F^\perp$ . Par définition de  $u^*$ , pour tout vecteur  $x$  de  $F$ , on a :

$\langle u(x), y \rangle = \langle x, u^*(y) \rangle$ . Comme  $x$  appartient à  $F$  qui est stable par  $u$ , alors  $u(x)$  appartient à  $F$ .

On en déduit :  $\langle u(x), y \rangle = 0$  puisque  $y$  appartient à  $F^\perp$ .

Finalement, pour tout vecteur  $x$  de  $F$ , on a :  $\langle x, u^*(y) \rangle = 0$ . Ainsi,  $u^*(y)$  appartient à  $F^\perp$ .

On en déduit que  $F^\perp$  est stable par  $u^*$ .

Kholle A 3)

1. a) Si  $a$  est une racine d'ordre au moins  $n+1$  de  $P$ , alors il existe un polynôme  $Q$  tel que :  $P = (X - a)^{n+1} Q$ . Si  $Q$  n'est pas le polynôme nul, alors on a :  $\deg P = n+1 + \deg Q \geq n+1$ . C'est absurde car  $P$  est élément de  $E$ . On en conclut que  $Q$  est nécessairement le polynôme nul. Finalement,  $P$  est le polynôme nul.

b) Soit  $P_1, P_2$  et  $Q$  trois éléments de  $E$  et  $\lambda$  un réel.

• On constate que  $\varphi(P, Q)$  est réel.

•  $\varphi(P, Q) = \sum_{i=0}^n P^{(i)}(a) Q^{(i)}(a) = \sum_{i=0}^n Q^{(i)}(a) P^{(i)}(a)$ . Ainsi, on a :  $\varphi(P, Q) = \varphi(Q, P)$ .

•  $\varphi(\lambda P_1 + P_2, Q) = \sum_{i=0}^n (\lambda P_1 + P_2)^{(i)}(a) Q^{(i)}(a) = \sum_{i=0}^n (\lambda P_1^{(i)}(a) + P_2^{(i)}(a)) Q^{(i)}(a)$ , grâce à la linéarité de la dérivation.

On en déduit :  $\varphi(\lambda P_1 + P_2, Q) = \lambda \sum_{i=0}^n P_1^{(i)}(a) Q^{(i)}(a) + \sum_{i=0}^n P_2^{(i)}(a) Q^{(i)}(a)$

Finalement, on a :  $\varphi(\lambda P_1 + P_2, Q) = \lambda \varphi(P_1, Q) + \varphi(P_2, Q)$ .

•  $\varphi(P, P) = \sum_{i=0}^n (P^{(i)}(a))^2 \geq 0$ , en tant que somme de carrés.

• Si  $\varphi(P, P) = 0$ , alors  $\sum_{i=0}^n (P^{(i)}(a))^2 = 0$ .

Une somme de réels positifs est nulle si et seulement si tous les termes de la somme sont nuls. On obtient :  $\forall i \in \llbracket 0, n \rrbracket, P^{(i)}(a) = 0$ . On en déduit que  $a$  est racine multiple de  $P$  avec un ordre au moins égal à  $n+1$  donc d'après la question 1.a),  $P$  est nul. Ainsi :  $\varphi(P, P) = 0 \Rightarrow P = 0$ . On en conclut que  $\varphi$  est un produit scalaire sur  $E$ .

**2. a)** Pour tout couple  $(i, j)$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket^2$ , on a :  $\langle P_i, P_j \rangle = \sum_{k=0}^n P_i^{(k)}(a) P_j^{(k)}(a)$ .

On sait que :  $\forall k \in \llbracket 0, i \rrbracket, P_i^{(k)} = \frac{i!}{(i-k)!} (X-a)^{i-k}$  et  $\forall k > i, P_i^{(k)} = 0$ .

On en déduit que pour tout  $k$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$  :  $P_i^{(k)}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq i \\ i! & \text{si } k = i \end{cases}$

De même, pour tout  $k$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ , on a :  $P_j^{(k)}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq j \\ j! & \text{si } k = j \end{cases}$ .

Par conséquent, pour tout  $i$  différent de  $j$ , on a :  $P_i^{(k)}(a) P_j^{(k)}(a) = 0$

Finalement, pour tout couple  $(i, j)$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket^2$  tel que  $i \neq j$ , on a :  $\langle P_i, P_j \rangle = \sum_{k=0}^n 0 = 0$ .

La famille  $(P_0, \dots, P_n)$  est constituée de  $n+1$  polynômes non nuls de  $E$ , qui est de dimension  $n+1$ . Ainsi, grâce au **théorème 5.1**, la famille  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base orthogonale de  $E$ .

$\Rightarrow$  Méthode 5.1

**b)** Pour tout entier naturel  $i$ , on a :  $\|P_i\|^2 = \sum_{k=0}^n (P_i^{(k)}(a))^2$ .

D'après la question 2.a), seul le terme d'indice  $k = i$  n'est pas nul dans cette somme, et ce terme vaut  $(i!)^2$ . Pour tout  $i$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ , on a donc  $\|P_i\|^2 = (i!)^2$ , d'où :  $\|P_i\| = i!$ .

On pose alors :  $Q_i = \frac{1}{i!} (X-a)^i$  et on a  $\|Q_i\| = 1$ . Comme la famille  $(P_0, \dots, P_n)$  est une base orthogonale de  $E$ , la famille  $\mathcal{B} = (Q_0, \dots, Q_n)$ , ainsi construite, est une base orthonormale de  $E$ .

**3.** Pour tout  $i$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ , la  $i^{\text{ème}}$  coordonnée d'un élément  $P$  de  $E$  dans la base orthonormale  $\mathcal{B}$  est  $\langle P, Q_i \rangle$ . Or  $Q_i^{(k)}(a) = \frac{1}{i!} P_i^{(k)}(a) = \begin{cases} 0 & \text{si } k \neq i \\ 1 & \text{si } k = i \end{cases}$  donc :  $\langle P, Q_i \rangle = \sum_{k=0}^n P^{(k)}(a) Q_i^{(k)}(a) = P^{(i)}(a)$ .

Ainsi, pour tout  $i$  de  $\llbracket 0, n \rrbracket$ , la  $i^{\text{ème}}$  coordonnée de  $P$  dans la base  $\mathcal{B}$  est  $P^{(i)}(a)$ .

On a donc :  $P = \sum_{i=0}^n P^{(i)}(a) Q_i$  et, grâce à la question 2.b), on obtient :  $P = \sum_{i=0}^n \frac{P^{(i)}(a)}{i!} (X-a)^i$ .

On retrouve ainsi la formule de Taylor pour les polynômes.

Bonus :

Soit  $x = (x_1, \dots, x_n)$  et  $y = (y_1, \dots, y_n)$  deux vecteurs de  $\mathbb{R}^n$ . L'inégalité de Cauchy-Schwarz, dans l'espace euclidien  $\mathbb{R}^n$  muni du produit scalaire canonique de  $\mathbb{R}^n$ , s'énonce ainsi :

$$\langle x, y \rangle^2 \leq \|x\|^2 \|y\|^2, \text{ c'est-à-dire } \left( \sum_{k=1}^n x_k y_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n x_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n y_k^2 \right).$$

Pour tout  $k$  de  $\llbracket 1, n \rrbracket$ , posons :  $x_k = k$  et  $y_k = \sqrt{k}$ . Ainsi :  $\left( \sum_{k=1}^n k\sqrt{k} \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n k \right)$ .

$$\text{On en déduit : } \left( \sum_{k=1}^n k\sqrt{k} \right)^2 \leq \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} \times \frac{n(n+1)}{2}.$$

Comme  $\sum_{k=1}^n k\sqrt{k}$  est positive (en tant que somme de termes positifs), on en conclut, grâce à la

croissance de la fonction racine carrée sur  $\mathbb{R}_+$  :  $\sum_{k=1}^n k\sqrt{k} \leq \sqrt{\frac{n^2(n+1)^2(2n+1)}{12}}$ .

Finalement, puisque  $n(n+1)$  est positif, on a :  $\sum_{k=1}^n k\sqrt{k} \leq \frac{n(n+1)\sqrt{2n+1}}{2\sqrt{3}}$ .

Soit  $x_1, \dots, x_n$  des réels strictement positifs. On pose :  $\forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ ,  $y_k = \sqrt{x_k}$  et  $z_k = \frac{1}{\sqrt{x_k}}$ .

L'inégalité de Cauchy-Schwarz, appliquée aux vecteurs  $y = (y_1, \dots, y_n)$  et  $z = (z_1, \dots, z_n)$  de  $\mathbb{R}^n$ ,

$$\text{s'écrit : } \left( \sum_{k=1}^n y_k z_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n y_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n z_k^2 \right).$$

On obtient alors :  $\left( \sum_{k=1}^n 1 \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n x_k \right) \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \right)$ . On en conclut :  $n^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n x_k \right) \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \right)$ .

D'après le **théorème 4.3**, il y a égalité si, et seulement si, la famille  $(y, z)$  est liée, c'est-à-dire, comme  $z$  n'est pas nul, si, et seulement si, il existe un réel  $\alpha$  tel que  $y = \alpha z$ .

$$\text{On a : } y = \alpha z \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, y_k = \alpha z_k \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sqrt{x_k} = \alpha \frac{1}{\sqrt{x_k}} \Leftrightarrow \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_k = \alpha.$$

Pour conclure, on a :  $n^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n x_k \right) \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k} \right)$ , avec égalité si, et seulement si,  $x_1 = \dots = x_n$ .

1. Notons  $p$  le projecteur orthogonal sur  $\mathbb{R}_2[X]$ . On sait que  $p(X^3)$  est défini par les deux conditions :  $p(X^3) \in \mathbb{R}_2[X]$  et  $X^3 - p(X^3) \in \mathbb{R}_2[X]^\perp$ .

•  $p(X^3) \in \mathbb{R}_2[X] \Leftrightarrow \exists (a, b, c) \in \mathbb{R}^3, p(X^3) = aX^2 + bX + c$ . On en déduit :

$$X^3 - p(X^3) = X^3 - aX^2 - bX - c.$$

$$\bullet X^3 - p(X^3) \in \mathbb{R}_2[X]^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} \langle X^3 - p(X^3), 1 \rangle = 0 \\ \langle X^3 - p(X^3), X \rangle = 0 \\ \langle X^3 - p(X^3), X^2 \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \int_0^{+\infty} (t^3 - at^2 - bt - c)e^{-t} dt = 0 \\ \int_0^{+\infty} (t^4 - at^3 - bt^2 - ct)e^{-t} dt = 0 \\ \int_0^{+\infty} (t^5 - at^4 - bt^3 - ct^2)e^{-t} dt = 0 \end{cases}$$

On rappelle que, pour tout  $n$  de  $\mathbb{N}$ , on a :  $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t} dt = n!$ .

$$\text{On en déduit : } X^3 - p(X^3) \in \mathbb{R}_2[X]^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} 6 - 2a - b - c = 0 \\ 24 - 6a - 2b - c = 0 \\ 120 - 24a - 6b - 2c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 9 \\ b = -18 \text{ (après calculs)} \\ c = 6 \end{cases}$$

On en conclut :  $p(X^3) = 9X^2 - 18X + 6$ .

2. a) On a :  $f(a, b, c) = \int_0^{+\infty} e^{-t} (t^3 - (at^2 + bt + c))^2 dt$ .

On obtient ainsi :  $f(a, b, c) = \|X^3 - (aX^2 + bX + c)\|^2 = \|X^3 - P\|^2$ .

b)  $\{ \|X^3 - P\|, P \in \mathbb{R}_2[X] \}$  admet un minimum atteint en un unique polynôme  $P_0$  de  $\mathbb{R}_2[X]$  défini par :  $P_0 = p(X^3)$ .

D'après la question 1, on a :  $P_0 = 9X^2 - 18X + 6$ .

D'après la question 2.a), on a :  $\min_{(a,b,c) \in \mathbb{R}^3} f(a, b, c) = \min_{P \in \mathbb{R}_2[X]} \|X^3 - P\|^2 = \|X^3 - P_0\|^2$ .

Or, on peut vérifier, que :  $\|X^3 - p(X^3)\|^2 = \|X^3\|^2 - \langle X^3, p(X^3) \rangle$ .

$$\text{On a : } \bullet \|X^3\|^2 = \int_0^{+\infty} t^6 e^{-t} dt = 720.$$

$$\bullet \langle X^3, p(X^3) \rangle = \int_0^{+\infty} t^3 (9t^2 - 18t + 6) e^{-t} dt = 9 \times 5! - 18 \times 4! + 6 \times 3! = 684.$$

On obtient donc :  $\|X^3 - P_0\|^2 = 36$ .

On déduit de la question 1 que  $f$  possède un minimum atteint en un unique triplet  $(9, -18, 6)$  et que ce minimum vaut 36.

Kholle C :

1. Question de cours.

2. a) L'application  $f$  est linéaire par linéarité à droite du produit scalaire.

$$\text{De plus, si } x, y \in E, \langle f(x) | y \rangle = \sum_{k=1}^n \langle e_k | x \rangle \langle e_k | y \rangle.$$

On constate que dans l'expression qu'on vient d'obtenir pour  $\langle f(x) | y \rangle$ ,  $x$  et  $y$  jouent des rôles symétriques donc  $\langle f(x) | y \rangle = \langle f(y) | x \rangle$  ce qui prouve que  $f$  est symétrique.

b) Soit  $\lambda$  une valeur propre de  $f$  et  $x$  un vecteur propre associé.

$$\text{Alors } \langle f(x) | x \rangle = \sum_{k=1}^n \langle e_k | x \rangle^2 > 0 \text{ car } x \text{ étant non nul, l'un au moins des } \langle e_k | x \rangle \text{ est non nul.}$$

$$\text{D'autre part, } \langle f(x) | x \rangle = \lambda \|x\|^2. \text{ Donc } \lambda = \frac{\langle f(x) | x \rangle}{\|x\|^2} > 0.$$

En particulier, 0 n'est pas valeur propre de  $f$  donc  $f$  est bijectif.

3. L'application  $\theta$  est clairement linéaire. Son noyau est réduit au polynôme nul car un polynôme de degré inférieur ou égal à  $p-1$  admettant  $p$  racines distinctes est nécessairement nul. De plus,  $\mathbb{R}_{p-1}[X]$  et  $\mathbb{R}^p$  sont deux espaces vectoriels de même dimension finie égale à  $p$  donc l'application  $\theta$  est un isomorphisme.

4. a) On a d'une part,  $f(f^{-1}(e_j)) = e_j$  et, par définition de  $f$ ,  $f(f^{-1}(e_j)) = \sum_{k=1}^n \langle e_k | f^{-1}(e_j) \rangle e_k$ .

Par unicité de la décomposition de  $e_j$  dans la base  $(e_1, \dots, e_n)$ , on en déduit que pour tout

$$k \in \llbracket 1, n \rrbracket, \langle e_k | f^{-1}(e_j) \rangle = \delta_{k,j} = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j; \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

b) Notons  $p$  le nombre de valeurs propres distinctes de  $f$ . D'après 3., il existe un (unique) polynôme  $P$  de degré au plus  $p-1$  tel que pour toute valeur propre  $\lambda$  de  $f$ , on ait  $P(\lambda) = \sqrt{\lambda^{-1}}$ .

On a alors pour tout vecteur propre  $x$  de  $f$  de valeur propre associée  $\lambda$ ,  $P(f)^2(x) = P(\lambda)^2 x = \lambda^{-1} x = f^{-1}(x)$  donc  $P(f)^2 = f^{-1}$  puisqu'il existe une base de  $E$  formée de vecteurs propres de  $f$ .

c) Remarquons que  $f$  étant symétrique, toutes les puissances de  $f$  le sont également donc  $g = P(f)$  est un endomorphisme symétrique de  $E$ .

On a donc pour tout  $(k, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2$ ,  $\langle g(e_k) | g(e_j) \rangle = \langle e_k | g^2(e_j) \rangle = \langle e_k | f^{-1}(e_j) \rangle = \delta_{k,j}$  donc la famille  $(g(e_1), \dots, g(e_n))$  est orthonormale, et étant de cardinal  $n = \dim E$ , c'est une base orthonormée de  $E$ .